



Protocoles - Chimiothérapie à domicile


Protocole HERCEPTIN® – Sous-cutané (Trastuzumab)				Version n°4 Du 12/02/2025		
Médicament		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume
J1	HERCEPTIN®	600 mg	Sous cutanée	2 à 5 minutes	Seringue de 10 ml	Produit pur
Cycle : J1-J21						
Surveillance biologique : - Fait lors des consultations, si nécessaire						

Modalités de prescription



Nombre de cycles selon avis :

- La première injection, au minimum, se fait en HDJ
- A partir du 2^{ème} cycle les injections peuvent se faire en HAD
- Consultation oncologue avec bilan complet tous les 3 mois



Suivi clinique avec l'oncologue/hématologue et process de validation

Le patient sera vu en consultation par le médecin oncologue tous les 3 mois environ pour évaluation de l'efficacité, de la tolérance et **contrôle cardiaque**. Il est préférable que le contrôle cardiaque et la consultation aient lieu avant la 5^{ème} cure.

Par ailleurs, chaque reconduction à domicile doit être validée :

- Soit par un professionnel habilité de l'établissement référent (médecin, IPA, interne) ;
- Soit par un professionnel extérieur compétent : médecin HAD (lorsque le patient est hospitalisé en HAD), médecin généraliste, etc.

Modalités d'administration

Traitement réalisé à domicile : à partir du 2^{ème} cycle

La réalisation des bilans biologiques (date et fréquence) dépend du mode de fonctionnement de l'établissement référent.

Avant chaque injection, interroger le patient sur l'apparition d'éventuels effets secondaires. En l'absence d'effets secondaires vous pouvez effectuer l'injection, sinon avis médical nécessaire.

Pas d'indication à refaire une dose de charge si intervalle de plus de 3 semaines non respecté.

Procédure du traitement

1. Désinfecter la zone d'injection avec de l'alcool
2. Préparer la peau en regard du lieu d'injection.
Le site d'injection doit être alterné **entre la cuisse gauche et la cuisse droite**.
Chaque nouvelle injection doit être pratiquée à au moins 2,5 cm de distance du site précédent et en aucun cas sur une zone sensible présentant une ecchymose, une rougeur ou une induration.
3. Afin de réduire l'incidence des réactions locales au site d'injection, **ne pas purger l'aiguille**.
4. Effectuer un retour avant d'injecter afin de s'assurer de ne pas injecter dans un vaisseau sanguin.
5. Injecter la seringue d'Herceptin® au niveau de la cuisse droite ou gauche pendant 2 à 5 minutes, **ne pas injecter plus de 0,5 ml la première minute** afin de permettre à la hyaluronidase d'agir pour la suite de l'injection. L'injection doit se faire avec une pression continue sans à-coups.
6. Un système de surveillance post injection doit être mis en place (30 min à la 1^{ère} injection, puis 15 min pour les suivantes).

Noter sur le dossier du patient tous les actes réalisés, les effets secondaires éventuels du traitement ainsi que le site d'injection.

Effets indésirables les plus fréquents

- Allergies lors des premières injections
- Surveillance cardiaque nécessaire tous les 3 mois

En cas d'apparition d'effets indésirables, veuillez contacter le numéro d'avis/d'urgence fourni par l'HAD.