




Protocoles - Chimiothérapie à domicile


Protocole PHESGO® (Pertuzumab - Trastuzumab)				Version n°1 12/02/2025	
Médicament	Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume
J1 – Dose de charge	1200 mg (P) – 600 mg (T)	Sous-cutanée	8 minutes + 30 minutes de surveillance	Seringue de 10 ml	Produit pur
J1 – Dose d'entretien	600 mg (P) – 600 mg (T)		5 minutes + 15 minutes de surveillance	Seringue de 10 ml	Produit pur
Cycle : J1 à J21					
Surveillance biologique :					
- Tous les 3 mois avant consultation médicale de réévaluation					

Modalités de prescription



Nombre de cycles selon avis médical :

- La première injection (dose de charge), au minimum, se fait en HDJ
- A partir du 2^{ème} cycle les injections (doses d'entretien) peuvent se faire en HAD
- Consultation oncologique avec bilan complet tous les 3 mois



Suivi clinique avec l'oncologue/hématologue et process de validation

Le patient sera vu en consultation par le médecin oncologue tous les 3 mois environ pour évaluation de l'efficacité, de la tolérance et **contrôle cardiaque**.

Par ailleurs, chaque reconduction à domicile doit être validée :

- Soit par un professionnel habilité de l'établissement référent (médecin, IPA, interne) ;
- Soit par un professionnel extérieur compétent : médecin HAD (lorsque le patient est hospitalisé en HAD), médecin généraliste, etc.

Modalités d'administration

Traitement réalisé à domicile : à partir du 2^{ème} cycle, il s'agit donc de la dose d'entretien.

La réalisation des bilans biologiques (date et fréquence) dépend du mode de fonctionnement de l'établissement référent.

Avant chaque injection, interroger le patient sur l'apparition d'éventuels effets secondaires. En l'absence de nouvel élément depuis l'évaluation médicale (la consultation – téléconsultation ou outil de surveillance) vous pouvez effectuer l'injection, sinon avis médical nécessaire.

Si traitement décalé de 6 semaines ou plus, administrer une dose de charge qui sera donc réalisée en HDJ.

Procédure du traitement

1. Désinfecter la zone d'injection avec de l'alcool
2. Préparer la peau en regard du lieu d'injection.
Le site d'injection doit être alterné **entre la cuisse gauche et la cuisse droite**.
Chaque nouvelle injection doit être pratiquée à au moins 2,5 cm de distance du site précédent et en aucun cas sur une zone sensible présentant une ecchymose, une rougeur ou une induration.
3. Afin de réduire l'incidence des réactions locales au site d'injection, **ne pas purger l'aiguille**.
4. Effectuer un retour avant d'injecter afin de s'assurer de ne pas injecter dans un vaisseau sanguin.
5. Injecter la seringue de PHESGO® au niveau de la cuisse droite ou gauche pendant 8 minutes pour la dose de charge (HDJ) et 5 minutes pour les doses d'entretien (HAD), **ne pas injecter plus de 0,5 ml la première minute** afin de permettre à la hyaluronidase d'agir pour la suite de l'injection. L'injection doit se faire avec une pression continue sans à-coups.

Noter sur le dossier du patient tous les actes réalisés, les effets secondaires éventuels du traitement ainsi que le site d'injection.

Effets indésirables les plus fréquents

- Allergies lors des premières injections
- Surveillance cardiaque nécessaire tous les 3 mois
- Diarrhées

En cas d'apparition d'effets indésirables, veuillez contacter le numéro d'avis/d'urgence fourni par l'HAD.