

Protocole VELCADE à domicile type VCD

Version n°3
Du 23/03/2018

Médicaments à domicile		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume
J1 - J4 J8 - J11	VELCADE	1.3 mg/m ²	Sous cutanée	2 minutes	Seringue 3 ml Luer Lock	Produit pur

Cycle J1-J21


Schéma :

- J1-J4-J8-J11 : VELCADE 1.3mg/m² SC
- J1-J4-J8-J11 : Dexamethasone 40mg per os
- J1-J8 : Endoxan 300 mg/m² IV ou per os

Surveillance biologique :

- Bilan biologique les veilles ou avant-veilles de J1 et J8 (si Endoxan IV)

MODALITES DE PRESCRIPTION



Nombre de cycles selon avis médical avec une moyenne de 8 cycles :

- La première cure se fait en HDJ


Si Endoxan IV

- Les J1 et J8 de chaque cycle se font en HDJ
- Les J4 et J11 de chaque cycle se font en HAD (à partir de C2)
- Bilan biologique les veilles ou avant-veilles de J1 et J8


Si Endoxan per os

- Le J1 de chaque cycle se fait en HDJ
- Les J4, J8 et J11 de chaque cycle se font en HAD (à partir de C2)
- Bilan biologique les veilles ou avant-veilles de J1

Si Endoxan IV



Si Endoxan per os



SUIVI CLINIQUE AVEC L'ONCOLOGUE/ HEMATOLOGUE

Si Endoxan IV : Réalisé en HDJ tous les J1 et J8 de chaque cycle.

Si Endoxan per os : Réalisé en HDJ tous les J1 de chaque cycle.

MODALITES D'ADMINISTRATION

J1, J4, J8, J11 : VELCADE sous cutané

La réalisation des bilans biologiques (date et fréquence) dépend du mode de fonctionnement de l'établissement référent.

Avant chaque injection, interroger le patient sur l'apparition d'éventuels effets secondaires. En l'absence d'effets secondaires vous pouvez effectuer l'injection, sinon avis médical nécessaire.

PROCEDURE DU TRAITEMENT

1. Demander au patient de positionner un patch d'Emla au niveau du lieu d'injection une heure avant l'injection.


2. Préparer la peau en regard du lieu d'injection défini par le schéma suivant.

Au cours d'un cycle, les lieux d'injection doivent être alternés.

Ne pas injecter au niveau du bras.

Alternier entre :

- Le quart supérieur ou inférieur, droit ou gauche de l'abdomen (1,2,7,8)
- Les parties distales ou proximales, droit ou gauche de la cuisse (3,4,5,6)



3. Afin de réduire l'incidence des réactions locales au lieu d'injection, ne pas purger l'aiguille.

4. Effectuer un retour avant d'injecter afin de s'assurer de ne pas injecter dans un vaisseau sanguin.

5. Injecter le VELCADE en sous-cutanée.

Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés ainsi que les effets secondaires éventuels du traitement.

EFFETS INDESIRABLES LES PLUS FREQUENTS

- **Neuropathies périphériques** à type de dysesthésie (diminution ou exagération de la sensibilité), douleurs, fourmillements, picotements, brûlures.
- **Toxicité digestive** à type de diarrhées ou constipation
- **Toxicité hématologique** : anémie, thrombopénie et neutropénie
- **Zona**
- **Réaction locale à l'injection**
- **Asthénie**
- **Hypotension orthostatique légère à modérée**

En cas d'apparition d'effets indésirables, veuillez contacter le numéro d'avis/ d'urgence fourni par l'HAD.