



Protocole VELCADE hebdomadaire				Version n°3 Du 23/03/2018		
Médicaments à domicile		Dose	Mode d'admin.	Temps d'admin.	Contenant	Diluant/volume
J1J8 J15J22	VELCADE	1.3 mg/m ²	Sous cutanée	2 minutes	Seringue 3 ml Luer Lock	Produit pur
Cycle: J1-J34 <ul style="list-style-type: none"> • Traitement associé: J1-J8-J15-J22-J29: Dexamethasone 20mg per os 						
Surveillance biologique : <ul style="list-style-type: none"> - Avant J1 : NFS, plaquettes, bilan hépatique, urée, créatinine, électrophorèse des protéines - J8, J15 et J22 : NFS, plaquettes 						

MODALITES DE PRESCRIPTION


Nombre de cycles selon avis médical avec une moyenne de 8 cycles :

- La première cure se fait en HDJ
- Tous les J1 se font en HDJ
- Tous les J8, J15 et J22 se font en HAD (à partir de C2)
- Bilan biologique les veilles ou avant-veilles des J1


SUIVI CLINIQUE AVEC L'ONCOLOGUE/ HEMATOLOGUE

Réalisé en HDJ tous les J1 de chaque cycle.

MODALITES D'ADMINISTRATION

J1, J8, J15, J22 : VELCADE sous cutané

La réalisation des bilans biologiques (date et fréquence) dépend du mode de fonctionnement de l'établissement référent.

Avant chaque injection, interroger le patient sur l'apparition d'éventuels effets secondaires. En l'absence d'effets secondaires vous pouvez effectuer l'injection, sinon avis médical nécessaire.

PROCEDURE DU TRAITEMENT

1. Demander au patient de positionner un patch d'Emla au niveau du lieu d'injection une heure avant l'injection.


2. Préparer la peau en regard du lieu d'injection défini par le schéma suivant.

Au cours d'un cycle, les lieux d'injection doivent être alternés.

Ne pas injecter au niveau du bras.

Alterner entre :

- Le quart supérieur ou inférieur, droit ou gauche de l'abdomen (1,2,7,8)
- Les parties distales ou proximales, droit ou gauche de la cuisse (3,4,5,6)



3. Afin de réduire l'incidence des réactions locales au lieu d'injection, ne pas purger l'aiguille.

4. Effectuer un retour avant d'injecter afin de s'assurer de ne pas injecter dans un vaisseau sanguin.

5. Injecter le VELCADE en sous-cutanée.

Noter sur le cahier de liaison tous les actes réalisés ainsi que les effets secondaires éventuels du traitement.

EFFETS INDESIRABLES LES PLUS FREQUENTS

- **Neuropathies périphériques** à type de dysesthésie (diminution ou exagération de la sensibilité), douleurs, fourmillements, picotements, brûlures.
- **Toxicité digestive** à type de diarrhées ou constipation
- **Toxicité hématologique : anémie, thrombopénie et neutropénie**
- **Zona**
- **Réaction locale à l'injection**
- **Asthénie**
- **Hypotension orthostatique légère à modérée**

En cas d'apparition d'effets indésirables, veuillez contacter le numéro d'avis/ d'urgence fourni par l'HAD.