

Temps d'annonce de la confirmation du diagnostic

Deuxième étape

OBJECTIF

Confirmer le diagnostic du patient.

Cette consultation peut être associée à l'annonce thérapeutique, ou être dissociée.



Établissement autorisé pour le traitement du cancer



Au plus vite après obtention des résultats confirmant le diagnostic



Médecin spécialiste en cancérologie impliqué dans le projet thérapeutique.
Avec accord du médecin et du patient, l'infirmier d'annonce peut y assister



AVANT LA CONSULTATION

- S'assurer de disposer de tous les éléments médicaux

PENDANT LA CONSULTATION

- Laisser le patient s'exprimer et évaluer son niveau d'information
- Rassurer le patient en évoquant :
 - Le recul de la maladie et le développement des nouvelles thérapies
 - L'importance de la qualité de vie ([Soins Oncologiques de Support](#))
 - Qu'il n'est pas seul mais entouré d'une équipe médicale et paramédicale
 - Que son médecin traitant et son pharmacien seront informés
 - L'existence de structures de coordination pour faciliter son suivi avec son médecin traitant
 - Le contact téléphonique du service spécialisé
 - Faire preuve de prudence face aux conseils de son entourage ou aux informations trouvées sur internet
- Expliquer le principe de la RCP ([Réunion de Concertation Pluridisciplinaire](#)) pour l'étude de son dossier
- Si la RCP n'a pas eu lieu, fixer une nouvelle date pour la **Consultation de proposition thérapeutique**
- Informer des suites du parcours de soins en précisant et en expliquant notamment le bilan d'extension
- Si le patient a plus de 75 ans, réaliser un dépistage gériatrique ([Grille G8](#)), pouvant conduire à une consultation d'oncogériatrie
- Vérifier que le patient a bien compris les informations transmises et a obtenu les réponses à ses questions
- Transmettre les coordonnées de l'infirmier de coordination (IDEC) et de l'Espace de Rencontre et d'Information (ERI)

APRÈS LA CONSULTATION

Faire une **lettre de liaison** au médecin traitant, et au pharmacien le cas échéant, avec :

- Les éléments transmis au patient (lexique employé)
- Éléments principaux de la réaction du patient
- Date de la RCP
- Contacts téléphoniques de l'équipe spécialisée

Populations spécifiques

Patients avec une pathologie chronique

Avant la RCP, contacter le spécialiste concerné.
Coordination avec le pharmacien hospitalier (prévenir les interactions médicamenteuses...)

Femmes enceintes

Discuter de la stratégie thérapeutique avec le professionnel de santé qui suit la grossesse.

Adolescents et jeunes adultes

- Selon l'âge, consultation avec les parents (sauf refus)
- Utiliser un vocabulaire approprié
- Rassurer sur la continuité du parcours scolaire
- Proposer soutien psychologique (parents et fratrie)