

Interventions préconisées selon la vulnérabilité du patient

Publics	Risques principaux	Interventions préconisées
TOUS LES PATIENTS, ADULTES OU ENFANTS, EN SITUATION COMPLEXE	<ul style="list-style-type: none"> Rupture dans le parcours 	<ul style="list-style-type: none"> Accompagnement par un infirmier de coordination (IDEC) en cancérologie ou un coordinateur de parcours Orientation vers un Dispositif d'Appui à la Coordination (DAC)
ENFANTS	<ul style="list-style-type: none"> Marginalisation d'un des deux parents en cas de divorce ou de séparation Difficultés de compréhension liées à l'âge de l'enfant Difficultés des parents et/ou de la fratrie à accepter la maladie grave 	<ul style="list-style-type: none"> Annonce en présence des deux parents, sauf situation exceptionnelle Orientation vers les prestations d'associations spécialisées Accompagnement psychologique de l'enfant et de la fratrie
ADOLESCENTS ET JEUNES ADULTES	<ul style="list-style-type: none"> Difficultés des patients, des parents et/ou de la fratrie à accepter la maladie grave 	<ul style="list-style-type: none"> Accompagnement psychologique Orientation vers les prestations d'associations spécialisées
PUBLICS ATTEINTS D'UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE	<ul style="list-style-type: none"> Difficultés de compréhension pouvant entraîner une rupture dans le parcours, voire une fragilisation 	<ul style="list-style-type: none"> Pour les personnes suivies en établissements médico-sociaux, mobilisation d'un des membres de l'équipe éducative
PERSONNES ÂGÉES	<ul style="list-style-type: none"> Difficultés de compréhension pouvant entraîner une rupture dans le parcours, voire une fragilisation 	<ul style="list-style-type: none"> Pour les personnes suivies en établissements médico-sociaux, mobilisation d'un des membres de l'équipe éducative Utilisation de supports dédiés
PERSONNES SOURDES ET/OU MALENTENDANTES	<ul style="list-style-type: none"> Difficultés de compréhension pouvant entraîner une rupture dans le parcours, voire une fragilisation 	<ul style="list-style-type: none"> Intervention d'un interprète spécialisé dans la langue des signes Utilisation d'outils adaptés
MIGRANTS	<ul style="list-style-type: none"> Représentation différente de la maladie et de ses traitements liée à la culture, pouvant conduire à un refus des soins conventionnels 	<ul style="list-style-type: none"> Intervention d'un interprète médical (si possible professionnel* ou d'un médiateur sanitaire) avec briefing et débriefing
PERSONNES EN SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE PRECAIRE	<ul style="list-style-type: none"> Risque de rupture dans le parcours, de fragilisation profonde 	<ul style="list-style-type: none"> Si la personne est suivie dans un établissement médico-social ou social de la structure Sinon, intervention de l'assistant.e social.e de l'établissement recommandé

* L'interprétariat par un proche, en particulier un enfant, doit être évité, dans la mesure du possible.