LES CANCERS DIGESTIFS CHEZ LES SUJETS ÂGÉS







Epidémiologie nationale et régionale des cancers digestifs

Anne Cowppli-Bony (Médecin épidémiologiste), Stéphanie Ayrault (Biostatisticien)
Registre des cancers de Loire-Atlantique Vendée













Préambule

- Indicateurs utilisés
 - Incidence = nouveaux cancers, exprimée en nombre et en taux d'incidence standardisé sur la structure d'âge de la population mondiale
 - Survie observée
- Registre des cancers de Loire-Atlantique/Vendée
 - Enregistrement depuis 1998 de tous les cancers survenant chez des personnes résidant en Loire-Atlantique et Vendée au diagnostic du cancer, quel que soit le lieu de prise en charge
- En France, estimations nationales de l'incidence et de la survie des cancers à partir des données des registres de cancers français








Sujets âgés (≥ 75 ans)

 La population âgée représente 31% des nouveaux cancers

- Evolution de l'incidence
 - Femme : 7 incidence
 - Homme: depuis 2005(FRA)/2008(LAV) avec une stabilisation durant les dernières années
 - Tendances similaires en LAV/France et chez les 0-74ans

Loire-Atlantique Vendée	France
(moyenne 2018-2020)	(2018)
≈4200 nouveaux cancers (2300 H - 1900 F)	≈120 000 nouveaux cancers (63000 H - 56000 F)

Evolution du taux d'incidence des cancers en LAV et en France



LAV = Taux d'incidence calculés à partir des données 1998-2022 du Registre LAV
FRA = Partenariat Francim-HCL-SpF-INCa Lapôtre-Ledoux B, et al. Incidence des principaux cancers en France métropolitaine
en 2023 et tendances depuis 1990. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(12-13):188-204









Cancers digestifs

- ≈ **30% des cancers** diagnostiqués chez les ≥ 75 ans
 - 18% chez les ≤ 74 ans (22% 70-74)
- Prédominance des cancers digestifs chez les hommes (+++ œsophage, foie, estomac)
 - Chez les ≥ 75 ans, cette prédominance
 - persiste mais marquée (æsophage, foie, estomac)
 - disparaît (colon-rectum)
 - voire s'inverse (pancréas, voies biliaires)





Estimation nationale en 2018. <u>Source</u>: Defossez G, et al. [Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.] 2019








Cancers digestifs chez les ≥ 75 ans

- Cancer colorectal le + fréquent (51%LAV 54%FRA)
 - Suivi des cancers du **pancréas** (17%LAV-FRA) et du **foie** (14%LAV 11%FRA)
- Différences selon le sexe
 - Côlon-Rectum, Pancréas : A Femme
 - Foie, Œsophage : ▲ Homme
- Particularités régionales
 - Chez l'homme : ▲ Foie ▼ Côlon-rectum

Type de cancers digestifs selon le sexe en LAV et en France



LAV = Incidence moyenne sur la période 2018-2020 calculée à partir des données du Registre LAV
FRA = Estimation nationale en 2018. Source: Defossez G, et al. [Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.] 2019

En lien avec une surincidence importante des cancers du foie chez l'homme en LA et V, et une sous-incidence des cancers colorectaux sur la période récente chez l'homme en LA (en comparaison à la France métropolitaine)








Cancers digestifs chez les ≥ 75 ans

- Cancer colorectal le + fréquent quel que soit l'âge
 - Suivi des cancers du pancréas et du foie
- Différences selon l'âge
 - Colon-Rectum : sujets ≥ 85 ans
 - Foie: ▼ sujets ≥ 85 ans
 - Pancréas : A sujets 75-79 ans en LAV ?
 - Pas de différence nette en France

Type de cancers digestifs selon l'âge en LAV et en France



LAV = Incidence moyenne sur la période 2018-2020 calculée à partir des données du Registre LAV FRA = Estimation nationale en 2018. Source: Defossez G, et al. [Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018.] 2019







Pancréas

Tendances globales


➤ FRA: **7** incidence H/F

> LAV : tendances similaires

Chez les sujets ≥ 75 ans

• 7 incidence H/F en LAV et en France

Evolution du taux d'incidence des cancers en LAV et en France



LAV = Taux d'incidence calculés à partir des données 1998-2022 du Registre LAV

FRA = Partenariat Francim-HCL-SpF-INCa Lapôtre-Ledoux B, et al. Incidence des principaux cancers en France métropolitaine en 2023 et tendances depuis 1990. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(12-13):188-204.







Foie

Tendances globales


➤ FRA: 7 incidence, stable depuis 2010 (H), 7 incidence (F)

> LAV : tendances similaires

Chez les sujets ≥ 75 ans

- Surincidence importante des cancers du foie chez l'homme en LAV (/FRA), retrouvée chez les 75+
- FRA: **Ϡ** incidence H/F
- LAV H : **7** incidence, stable depuis 2010
 - F: Tendance **₹** incidence

Evolution du taux d'incidence des cancers en LAV et en France



LAV = Taux d'incidence calculés à partir des données 1998-2022 du Registre LAV

FRA = Partenariat Francim-HCL-SpF-INCa Lapôtre-Ledoux B, et al. Incidence des principaux cancers en France métropolitaine en 2023 et tendances depuis 1990. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(12-13):188-204.







Côlon-rectum

Tendances globales

➤ FRA: > incidence (H), 7 incidence (F, +++ jeunes)

➤ LAV : → incidence (H), pas de tendance nette (F)

Chez les sujets ≥ 75 ans


FRA :

incidence (H/F)

LAV - H : \(\mathbf{\su}\) incidence depuis 2014

- F : pas de tendance

Evolution du taux d'incidence des cancers en LAV et en France



LAV = Taux d'incidence calculés à partir des données 1998-2022 du Registre LAV

FRA = Partenariat Francim-HCL-SpF-INCa Lapôtre-Ledoux B, et al. Incidence des principaux cancers en France métropolitaine en 2023 et tendances depuis 1990. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(12-13):188-204







Œsophage

Tendances globales

> FRA: \(\textbf{\final}\) incidence (H) \(\textbf{\final}\) incidence (F)

➤ LAV : ➤ incidence (H), pas de tendance nette (F)


Chez les sujets ≥ 75 ans

• FRA: incidence 🔰 (H), 🗷 (F)

LAV : - Surincidence H connue, retrouvée chez les 75+

- Pas de tendance (H/F)

Evolution du taux d'incidence des cancers en LAV et en France



LAV = Taux d'incidence calculés à partir des données 1998-2022 du Registre LAV FRA = Partenariat Francim-HCL-SpF-INCa Lapôtre-Ledoux B, et al. Incidence des principaux cancers en France métropolitaine en 2023 et tendances depuis 1990. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(12-13):188-204







Estomac

Tendances globales


➤ FRA: **\(\right)** incidence (H/F)

➤ LAV : ≥ incidence (H), pas de tendance nette (F)

Chez les sujets ≥ 75 ans

incidence H/F en LAV et en France

Evolution du taux d'incidence des cancers en LAV et en France



LAV = Taux d'incidence calculés à partir des données 1998-2022 du Registre LAV

FRA = Partenariat Francim-HCL-SpF-INCa Lapôtre-Ledoux B, et al. Incidence des principaux cancers en France métropolitaine en 2023 et tendances depuis 1990. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(12-13):188-204







Intestin grêle

Tendances globales

> FRA: 7 incidence (H)

Chez les sujets ≥ 75 ans

• FRA: **7** incidence (H)

Vésicule et voies biliaires

Tendances globales

➤ FRA: **7** incidence (H), **1** incidence (F)

- Chez les sujets ≥ 75 ans
 - FRA: **Ϡ** incidence (H), **᠔** incidence (F)








Survie des cancers digestifs

- La plupart des cancers digestifs sont de mauvais pronostic à 5 ans
 - Pancréas, Foie, V. Biliaires, Œsophage, Estomac
- Survie en LAV ≈ survie en France
- Meilleur survie à 5 ans chez les femmes (sauf cancers hépatiques et biliaires)
 - Ecart plus marqué chez les sujets 75+
- Survie avec l'âge
 - Ces écarts de survie existent dès la 1^{ère} année après le diagnostic



LAV = Survie observée calculée à partir des données du Registre LAV

FRA = Partenariat Francim-HCL-SpF-INCa. Coureau G,et al. Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018 – 2021








Survie des cancers digestifs

- Amélioration de la survie pour tous les cancers digestifs
 - Pancréas, estomac : gain de survie notable à 1 an mais faible augmentation de la survie à 5 ans
- Les sujets âgés bénéficient des améliorations de la survie à 1 an et à 5 ans
 - Reflet d'une amélioration de la prise en charge initiale de cette population
- Tendances similaires en LAV



Sources: Partenariat Francim-HCL-SpF-INCa. Coureau G,et al. Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018 – 2021







En conclusion

- Les cancers digestifs représentent 30% des cancers chez les sujets âgés
- Incidence
 - Les particularités régionales (surincidence des cancers liés à l'alcool (foie+++, œsophage)) s'observent également chez les sujets âgés
 - Les évolutions de l'incidence sont similaires à celles de la population globale

Survie

- La plupart des cancers digestifs sont de mauvais pronostic à 5 ans
- La survie des cancers digestifs s'est améliorée chez les sujets âgés (comme dans la population globale), traduisant une amélioration de la prise en charge initiale

MERCI DE VOTRE ATTENTION



